




หนอนกอข้าว

Rice stem borers



แมลง : กลุ่มผีเสื้อกลางคืน

หนอนกอสีครีม (*Scirpophaga incertulas*)
หนอนกอแถบลาย (*Chilo suppressalis*)
หนอนกอแถบลายหัวดำ (*Chilo polychrysus*)
หนอนกอสีชมพู (*Seasama inferens*)

ลักษณะการทำลาย

ตัวหนอนกัดกินภายในลำต้นข้าว
ยอดเหี่ยว แห้งตาย รวงข้าวมีสี
ขาว เมล็ดลีบทั้งรวง เรียกว่า
“ข้าวหัวหงอก” รวงข้าวจะตึง
หลุดออกมาได้ง่าย



ข้าวหัวหงอก

ช่วงเวลาระบาด

ตั้งแต่ต้นข้าวยังเล็ก
จนถึงระยะออกรวง

เริ่มตั้งแต่



ระยะกล้า

ระยะแตกกอ

ระยะตั้งท้อง

ระยะเก็บเกี่ยว

การแพร่กระจาย




ผีเสื้อตัวเต็มวัย

การป้องกันกำจัด



สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง



ปลูกพืชหมุนเวียน



ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป



ไถดินทำลายดักแด้
และหนอนที่อยู่ตามตอซัง



ไม่ใช่สารฆ่าแมลงชนิดเบ็ด
ในนาข้าวเพื่อช่วยอนุรักษ์
ศัตรูธรรมชาติ พวกแตนเบียนไข่
และแตนเบียนหนอน



เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในข้าว
อายุ 3 - 4 สัปดาห์ หลังหว่าน/ปักดำ
ในระดับ 10 - 20 % ของพื้นที่ปลูก
ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ำ เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซี)
อัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว