



แมลงบั่ว

Rice stem gall midge



แมลง : กลุ่มแมลงวัน แมลงบั่ว (*Orseolia oryzae*)

ลักษณะการทำลาย


ตัวหนอนเข้าทำลายยอดที่กำลังเจริญทำให้
เกิดเป็นหลอดลักษณะคล้ายหลอดหอม
ต้นข้าวและกอข้าวที่ถูกทำลายจะมีการ
แคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มีสีเขียวเข้ม
ยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้




หลอดบั่วหรือหลอดหอม

ช่วงเวลาระบาด

ระยะข้าวแตกกอจะเป็นระยะที่
แมลงบั่วเข้าทำลายมาก และจะพบ
แมลงบั่วระบาดมากในช่วงฤดูฝน



การแพร่กระจาย



แมลงบั่วตัวเต็มวัย

การป้องกันกำจัด



สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง



ไม่ควรหว่านข้าวหรือปักดำข้าว
ที่เกินไป



กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา
เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวหนก หญ้าไซ
หญ้าชันอากาศ เพื่อทำลายพืช
อาศัยของแมลงบั่ว



ทำลายตัวเต็มวัยที่บินมา
เล่นไฟตามผนังบ้านใน
ช่วงฤดูปลูก ระหว่างเวลา
19.00-21.00 น.



สุ่มสำรวจแปลงนาเมื่อพบ
เป็นหลอดคล้ายหลอดหอม 3-5 %
ในช่วงข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ
ใช้สารกำจัดแมลง คลอไทอะนิติน 16 % SG
หรือคลอร์ไพริฟอส 40 % EC หรือ อีทีโพรา 10 % SG



อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
เช่น แมงมุม และ
แตนเบียนของแมลงบั่ว